



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Trzebnicy**


**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Trzebnicy**

55 – 100 Trzebnica, ul. Obrońców Pokoju 7

tel. 071/312-07-62, fax. 071/312-12-31 e-mail oswiata.trzebnica@wp.pl

OZ-731-9- 46/IK/13

Trzebnica, dnia 19 grudnia 2013 r.



Urząd Miejski w Trzebnicy

Urząd Miejski w Obornikach Śląskich

Urząd Miejski w Żmigrodzie

Urząd Miasta i Gminy w Prusicach

Urząd Gminy Wisznia Mała

Urząd Gminy Zawonia

Dotyczy : Metanolu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Trzebnicy, Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia zwraca się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na stronach internetowych Gmin załączonych materiałów. Prosimy także o wydrukowanie i umieszczenie materiałów na tablicach informacyjnych w budynkach Urzędów Miast i Gmin.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Trzebnicy

lek. med. Renata Widłak - Stępień

Załączniki:

1. Ulotka Metanol
2. Plakat Metanol



Główny Inspektor Sanitarny



**Państwowa Agencja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych**

OSTRZEGAJĄ

przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego do spożycia dla ludzi i zwraca się z prośbą o informowanie użytkowników alkoholu o konsekwencjach picia alkoholu pochodzącego z nieznanego źródła.

4-15 ml ($\frac{1}{2}$ kieliszka do wódki) **alkoholu metylowego** uszkadza nerw wzrokowy
30 ml (ok. 1 kieliszek wódki) **alkoholu metylowego** to dawka śmiertelna

Gdzie najczęściej występuje metanol:

- w alkoholu niewiadomego pochodzenia (np. zakupionym na bazarach)
- w płynach do spryskiwaczy
- w denaturacie
- w odmrażaczach do szyb
- w rozpuszczalnikach

Objawy zatrucia alkoholem metylowym:

- pierwsze objawy po wypiciu alkoholu metylowego są takie same jak po wypiciu alkoholu spożywczego (etylowego)
- następnie pojawiają się:
 - ⇒ bóle i zawroty głowy, przyspieszony oddech, nudności, wymioty
 - ⇒ silne bóle brzucha, światłowstręt i inne zaburzenia widzenia, przyspieszone bicie serca
 - ⇒ senność, śpiączka i głębokie zaburzenia świadomości (utrata przytomności, bez możliwości dobudzenia zatrutego)


Pierwsza pomoc:

- wezwać pogotowie ratunkowe
- jeśli zatruty jest przytomny:
 - ⇒ wywołać u niego wymioty
 - ⇒ podać do picia $\frac{1}{2}$ szklanki bezpiecznego 40% alkoholu etylowego (wódki)
 - ⇒ jeśli nie ma wódki, to podać łyżkę sody oczyszczonej lub proszku do pieczenia rozpuszczonych w $\frac{1}{2}$ szklanki wody

**W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy
niezwłocznie udać się do najbliższego szpitala lub wezwać pomoc**

TEL: 999, 997 lub 112

UWAGA! METANOL ZABIJA!



WYPICIE
ALKOHOLU NIEWIADOMEGO POCHODZENIA
ORAZ ŚRODKÓW NIEPRZEZNACZONYCH
DO SPOŻYCIA MOŻE SPOWODOWAĆ
ŚLEPOTĘ A NAWET ŚMIERĆ!



Ministerstwo
Zdrowia



DARDA